

GCS(GEM+CDDP+S-1)療法(胆道癌)

1サイクルの日数:14日

化学療法内容

Rp	薬剤名	標準投与量	投与スケジュール(日)	
			1 ... 8 ... 14	
1	アプレピタント 1日目は125mgを投与前に服用、2日目3日目は80mgを午前に服用		day1.2.3	
2	生理食塩液 1000mL 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL 点滴静注 180分	1袋 1管	○	×
3	20%マンニトール注射液 300mL 点滴静注 (Rp1と同時に開始) 45分	1瓶	○	×
4	パロノセトロン塩酸塩点滴静注 0.75mg 50mL デキサメタゾン リン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg 点滴静注 (Rp2終了後に開始) 15分	1瓶 2管	○	×
5	シスプラチン注 生理食塩液 500mL 点滴静注 (Rp3終了後に開始) 60分	25mg/m ² 1袋	○	×
6	ゲムシタビン点滴静注 生理食塩液 100mL 点滴静注 (Rp4終了後に開始) 30分	1000mg/m ² 1キット	○	×
7	生理食塩液 100mL 点滴静注 (Rp5終了後に開始) 全開で	0.5キット	○	×
8	S-1 朝夕食後に内服 7日間			夕～開始 朝まで

S-1投与量

体表面積	1回投与量
1.25 m ² 未満	40 mg
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	50 mg
1.5 m ² 以上	60 mg

点滴当日夕食後より内服開始、7日間内服、7日間休薬