

BV+XELOX(CapeOX)療法(大腸癌)

1サイクルの日数:21日

化学療法内容

Rp	薬剤名	標準投与量	投与スケジュール(日)			
			1	...	8	...
1	パロノセトロン塩酸塩点滴静注 0.75mg 50mL	1袋	○		×	×
	デキサメタゾン リン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg 点滴静注 30分	1管				
2	ベバシズマブ点滴静注	7.5mg/kg	○		×	×
	生理食塩液 100mL 点滴静注 30~90分	1キット				
3	オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	○		×	×
	デキサメタゾン リン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg 5%ブドウ糖液 250mL 点滴静注 120分	1管 1袋				
4	生理食塩液 20mL 静注(フラッシュ)	1本	○		×	×
5	カペシタビン錠 300mg 朝夕食後に内服 14日間		タ~開始 朝まで			

ベバシズマブは、初回投与は90分、忍容性良好なら2回目60分、さらに忍容性良好なら以降30分

カペシタビン投与量

体表面積	1回投与量
1.36 m ² 未満	1200 mg
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1500 mg
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1800 mg
1.96 m ² 以上	2100 mg

点滴当日夕食後より内服開始、14日間内服、7日間休薬