

BV+FTD/TPI療法(大腸癌)

1サイクルの日数28日

化学療法内容

Rp	薬剤名	標準投与量	投与スケジュール(日)			
			1 ... 8	...	15 ... 21	...
1	生理食塩液 100mL 点滴静注 30分	1キット	○	×	○	×
2	ベバシズマブ点滴静注 生理食塩液 100mL 点滴静注 30~90分	5mg/kg 1キット	○	×	○	×
3	生理食塩液 20mL 静注(フラッシュ)	1本	○	×	○	×
4	FTD/TPI 朝夕食後に内服 5日間を2回	70mg/m ²	day1夕~day6朝まで day8夕~day13朝			

ベバシズマブは、初回投与は90分、忍容性良好なら2回目60分、さらに忍容性良好なら以降30分

FTD/TPI 投与量

体表面積	1回投与量
1.07 m ² 未満	35 mg
1.07 m ² 以上 1.23 m ² 未満	40 mg
1.23 m ² 以上 1.38 m ² 未満	45 mg
1.38 m ² 以上 1.53 m ² 未満	50 mg
1.53 m ² 以上 1.69 m ² 未満	55 mg
1.69 m ² 以上 1.84 m ² 未満	60 mg
1.84 m ² 以上 1.99 m ² 未満	65 mg
1.99 m ² 以上 2.15 m ² 未満	70 mg
2.15 m ² 以上	75 mg

day1夕食後より内服開始、5日間内服、2日間休薬。 Day8夕食後より内服、5日間内服、その後休薬。