

# HER+XP(ハーセプチン+XP)療法(胃癌)

1サイクルの日数:21日

## 化学療法内容

Rp	薬剤名	標準投与量	投与スケジュール(日)						
			1	...	8	...	15	...	21
1	L-乳酸ナトリウムリンゲル液 500mL 点滴静注 120分	1袋	○		×			×	
2	ブドウ糖-電解質液(維持液) 500mL 点滴静注 120分	1瓶	○		×			×	
3	アセトアミノフェン錠 300mg 内服 トラスツズマブ注30分前に服用	1錠	○		×			×	
4	トラスツズマブ注射用 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg 生理食塩液 初回250mL、2回目以降100mL 点滴静注 初回90分、2回目以降30分		○		×			×	
5	パロノセトロン塩酸塩点滴静注 0.75mg 50mL デキサメタゾン リン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg 点滴静注 15分	1袋 2管	○		×			×	
6	シスプラチン点滴静注液 生理食塩液 500mL 点滴静注 120分	80mg/m <sup>2</sup> 1袋	○		×			×	
7	L-乳酸ナトリウムリンゲル液 500mL 点滴静注 180分	1袋	○		×			×	
8	カペシタビン錠 300mg 朝夕食後に内服 14日間		タ～開始 朝まで						

## ゼローダ投与量

体表面積	1回投与量
1.36 m <sup>2</sup> 未満	1200 mg
1.36 m <sup>2</sup> 以上 1.66 m <sup>2</sup> 未満	1500 mg
1.66 m <sup>2</sup> 以上 1.96 m <sup>2</sup> 未満	1800 mg
1.96 m <sup>2</sup> 以上	2100 mg

点滴当日夕食後より内服開始、14日間内服、7日間休薬

## トラスツズマブ

投与回	投与量	生理食塩液	投与時間
初回	8 mg/kg	250 ml	90分
2回目以降	6 mg/kg	100 ml	30分※

※忍容性が良好であれば