

<放射線科検査の食事制限・水分制限について>

		食事制限	水分制限	食事制限・水分制限が必要となる理由
CT	造影検査(腹部以外)*	3時間前から	水・お茶のみ可	副作用が出た場合、嘔吐による誤嚥や窒息を防ぐ為
	腹部検査(造影の有無にかかわらず)	5時間前から		食事後の胆嚢収縮を無くす為

		食事制限	水分制限	食事制限・水分制限が必要となる理由
MRI	腹部・骨盤腔検査(造影の有無にかかわらず)	5時間前から	水・お茶のみ可	腹部：食事後の胆嚢収縮を無くす為 骨盤腔：腸の動きを抑制する為

*腹部・骨盤腔以外の検査は造影の有無にかかわらず食事・水分制限無し

		食事制限	水分制限	食事制限・水分制限が必要となる理由
RI	負荷心筋マイオビュー	12時間前から絶食	水のみ可	カフェインなどを摂取すると負荷薬剤の効能効果が悪くなる為
	心筋マイオビュー(安静時)	無し	無し	食事を摂取する方が好ましい
	心筋BMIPP	3時間前から絶食	無し	食事をすると、消化管などに薬剤が集積し、目的部位の画像に影響が出てしまう為
	急性心筋梗塞			
	T1腫瘍			